HUBUNGAN LAMA KALA III PERSALINAN DENGAN KEJADIAN PERDARAHAN PADA IBU *POST PARTUM* DI RSUD 45 KUNINGAN

Nita Ike Dwi Kurniasih, Cecep Heriana, Evi Soviyati, Ryan Apriyanti

STIKes Kuningan

nitaikedk@gmail.com

Abstrak

Persalinan kala III merupakan bagian dari proses persalinan yang tidak bisa di pandang sebelah mata karena Angka Kematian Ibu di Indonesia masih tinggi salah satunya adalah perdarahan sebesar (42%) dimana sebagian besar disebabkan oleh atonia uteri dan retensio plasenta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan Lama Kala III Persalinan Dengan Kejadian Perdarahan Pada Ibu *Post Partum* di RSUD 45 Kuningan Kabupaten Kuningan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian analitik dengan rancangan *kohort retrospektif* menggunakan metode kuantitatif. Jumlah sampel ditentukan dengan perhitungan slovin sebanyak 92, dengan teknik pengambilan *random sampling*. Analisa data menggunakan analisa univariat dan bivariat dengan uji *Chi Square*.

Hasil analisis univariat menunjukkan bahwa dari 92 ibu bersalin waktu lama kala III $\leq$ 15 menit sebanyak 64 orang (69,6%), sedangkan yang mengalami perdarahan *post partum* sebanyak 21 orang (22.8%). Uji *Chi Square* diperoleh nilai p value = 0,044 < 0,05. Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan lama kala III dengan kejadian perdarahan pada ibu *post partum* di RSUD 45 Kuningan Kabupaten Kuningan. Disarankan bagi tenaga kesehatan khususnya bidan lebih meningkatkan kualitas dalam prosedur penanganan persalinan terutama dalam penerapan manajemen aktif kala III untuk menurunkan angka kejadian pascapersalinan..

Kata kunci : lama kala III, Perdarahan, post partum

Pendahuluan

Keberhasilan upaya kesehatan ibu dapat dilihat dari indikator angka kematian

ibu. Menurut *World Health Organisation* (WHO) wanita berusia 15 sampai 49 tahun sekitar 600.000 meninggal dunia setiap

tahunnya karena mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan. Kematian ibu di Negara berkembang pada tahun 2015 adalah 239 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan di Negara maju jauh lebih rendah yaitu 12 per 100.000 kelahiran hidup (WHO, 2018).

Lima penyebab kematian ibu terbesar di Indonesia yaitu pendarahan, Hipertensi Dalam Kehamilan (HDK), infeksi, partus lama atau macet, dan abortus. Kematian ibu di Indonesia masih didominasi oleh tiga penyebab utama kematian yaitu pendarahan, hipertensi dalam kehamilan dan infeksi. Pendarahan pasca persalinan adalah salah satu penyebab langsung kematian ibu, hampir seperempat dari semua kematian ibu di seluruh dunia yang melibatkan 150.000 kematian dalam satu tahun, terutama terjadi di negara berkembang. Sebagian besar dari kematian ibu (88%) terjadi dalam 4 jam setelah persalinan, menandakan bahwa ini merupakan kejadian yang berkaitan erat dengan persalinan kala III (Prawiroharjo, 2012).

Menurut WHO banyak 99% kematian ibu akibat masalah persalinan atau kelahiran terjadi di negara-negara berkembang. Rasio kematian ibu di negara-negara berkembang merupakan yang

tertinggi dengan 450 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup jika dibandingkan dengan rasio kematian ibu di sembilan negara maju dan 51 negara persemakmuran. Sejumlah kasus kematian ibu sebanyak 81% terjadi akibat komplikasi selama hamil, bersalin dan 25% selama masa nifas. Upaya dalam penurunan kematian atau kesakitan itu tercantum dalam SDGs (*Sustainable Development Goals*). Ada 17 tujuan global dalam SDGs yang berkaitan dengan upaya penurunan kematian atau kesakitan ibu pada nomor 2 yaitu kesehatan yang baik dan kesejahteraan (Wardah, 2016).

Pendarahan *post partum* menjadi penyebab utama kematian ibu di Indonesia dan robekan jalan lahir merupakan penyebab kedua perdarahan setelah atonia uteri yang terjadi pada hampir persalinan pertama dan tidak jarang juga pada persalinan berikutnya (Prawiroharjo, 2012). Faktor penyebab perdarahan yang paling sering yaitu atonia uteri serta retensio plasenta, adapun penyebab lain yaitu laserasi serviks atau vagina, ruptur uteri, inversio uteri dan infeksi nifas.

Perdarahan *post partum* juga bisa terjadi karena riwayat persalinan yang buruk, diantaranya pada saat proses kelahiran plasenta. Pelepasan plasenta

merupakan bagian dari manajemen kala III dalam persalinan yang bertujuan untuk menghasilkan uterus secara spontan berkontraksi keras dengan isi yang sudah kosong, karena bayi sudah lahir sehingga mempercepat kelahiran plasenta dan dapat mencegah atau mengurangi pendarahan postpartum (Prawiroharjo, 2012). Faktor yang mempengaruhi lamanya kala III diantaranya umur dan paritas, dimana umur yang belum produktif sangat mempengaruhi proses persalinan, sedangkan pada paritas mempengaruhi efektifitas uterus dalam semua tahapan persalinan. Lamanya kala III normal adalah 5 sampai 15 menit (Sisca Alviani et al., 2018).

Penegangan Tali pusat Terkendali PTT dengan cara satu tangan diletakan pada korpus uterus tepat di atas simfisis pubis, jika menggunakan manajemen aktif kala III tetap tidak ada tanda pelepasan plasenta setelah 15 menit, maka ulangi pemberian oksitosin 10 unit IM dosis kedua, dalam jarak waktu 15 menit dari pemberian

oksitoksin dosis pertama (Nurasiah et al., 2014).

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian analitik dengan rancangan *kohort retropektif* yang digunakan untuk mengetahui hubungan lama kala III persalinan dengan kejadian perdarahan ibu *post partum* di RSUD 45 Kuningan. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu bersalin di RSUD 45 Kuningan, dengan jumlah sampel ditentukan dengan perhitungan *slovin* sebanyak 92, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *random sampling*. Pengumpulan data dilakukan observasi dengan menggunakan daftar ceklis. Analisa data yang digunakan menggunakan analisa univariat dan bivariat dengan uji *Chi Square*.

Hasil

Analisa Univariat

Berikut disajikan tabel distribusi frekuensi univariat:

Tabel 1 Gambaran Distribusi Frekuensi Lama Kala III ibu bersalin dan perdarahan pascasalin persalinan Di RSUD 45 Kuningan

Vaiabel	Frekuensi (f)	Persentase (%)
---------	---------------	----------------

Lama Kala III		
≤ 15 menit	64	69,6
15–30menit	21	22,8
≥ 30 menit	7	7,6
Jumlah	92	100
Perdarahan		
≥ 500 cc	21	22,8
<500 cc	71	77,2
Jumlah	92	100

Tabel 2 Hubungan Antara Lama Kala III persalinan dengan Kejadian Perdarahan Ibu Post Partum di Rumah Sakit 45 Kuningan Kabupaten Kuningan

Lama Kala III	Kejadian Perdarahan Post Partum				Jumlah		ρ_{value}
	Anemia		Tidak Anemia		N		
	Ya	%	Tidak	%			
≤ 15 menit	11	17.2	53	82.8	64	100	0,044
15–30 menit	6	28.6	15	71.4	21	100	
≥ 30 menit	4	57.1	3	42.9	7	100	

Pembahasan

Kala III persalinan dimulai setelah bayi lahir sampai plasenta keluar. Biasanya plasenta lepas dalam waktu 6 sampai 15 menit setelah bari lahir dan lahir spontan atau dengan adanya tekanan dari fundus uteri (Nurasiah et al., 2014). Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa lama kala III persalinan cenderung lebih banyak dengan waktu ≤ 15 menit dibandingkan

dengan waktu lama kala III ≥ 30 menit. Hal ini disebabkan karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi lamanya kala III diantaranya kelainan dari uterus, dari palsenta dan sifat plasenta pada uterus, adapun karena kesalahan manajemen kala III yang kurang tepat sehingga menyebabkan serviks kontaksi dan menahan plasenta serta pemberian anastesi.

Hasil penelitian juga menunjukkan sebanyak 21 orang (22.8%) yang mengalami perdarahan dan sebagian besar 71 orang (77.2%) tidak mengalami perdarahan pasca persalinan. Perdarahan pasca persalinan merupakan perdarahan pervaginam yang melebihi 500 ml melalui jalan lahir yang terjadi selama atau setelah persalinan kala III. Pada praktisnya tidak perlu mengukur jumlah perdarahan sampai sebanyak itu sebab menghentikan perdarahan lebih dini akan memberikan prognosis lebih baik. Apabila terdapat perdarahan lebih dari normal, bahkan sampai terjadi perubahan tanda vital (kesadaran menurun, pucat, sesak nafas, serta tensi < 90 mmHg dan nadi >100/menit maka penanganan harus segera dilakukan (Nurjanah et al., 2013)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ada hubungan signifikan antara hubungan lama kala III persalinan dengan kejadian perdarahan ibu *post partum* di Rumah Sakit 45 Kuningan Kabupaten Kuningan dengan nilai p 0,044. Hasil penelitian menunjukkan ibu bersalin dengan lama kala III ≤ 15 menit yang tidak mengalami perdarahan post partum sebanyak 82,8%, lama kala III 15-30% menit yang tidak mengalami perdarahan post partum sebanyak 71,4% dan lama kala

III ≥ 30 menit yang tidak mengalami perdarahan post partum sebanyak 42,9%. Ibu bersalin dengan lama kala III ≤ 15 menit yang mengalami perdarahan post partum sebanyak 17,2%, lama kala III 15-30% menit yang mengalami perdarahan post partum sebanyak 28,6% dan lama kala III ≥ 30 menit yang mengalami perdarahan post partum sebanyak 57,1%.

Semakin cepat lama kala III persalinan akan semakin mengurangi kejadian perdarahan pada ibu *post partum*. Rata-rata pelepasan plasenta yaitu 5 – 15 menit, resiko perdarahan akan meningkat ketika kala III lebih dari 30 menit (Sisca Alviani et al., 2018).

Plasenta lepas dalam waktu 6 sampai 15 menit setelah bari lahir dan lahir spontan atau dengan adanya tekanan dari fundus uteri. Jika plasenta tidak lepas setelah melakukan penegangan tali pusat setelah 15 menit maka lakukan pengulangan pemberian oksitosin 10 IU secara IM yang kedua (Prawiroharjo, 2012). Adapun plasenta yang tidak lahir dalam 30 menit setelah bayi lahir disebut retensio uteri, namun bila dalam 30 menit belum lepas sama sekali tidak akan terjadi perdarahan, tapi bila sebagian plasenta sudah lepas akan terjadi perdarahan dan ini

merupakan indikasi untuk segera mengeluarkannya (Mochtar, 2012).

Lama kala III persalinan bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor yaitu diantaranya kelainan dari uterus, dari plasenta dan sifat plasenta pada uterus, adapun karena kesalahan manajemen kala III yang kurang tepat sehingga menyebabkan serviks kontraksi dan menahan plasenta serta pemberian anastesi. Sebagian besar ibu bersalin dengan lama kala III ≤ 15 menit 64 orang dan sebagian besar ibu *post partum* yang mengalami perdarahan sebanyak 21 orang dari 92 responden, maka dari itu semakin cepat lama kala III akan mengurangi kejadian perdarahan ibu *post partum*. Namun dilihat dari data yang diperoleh lamanya kala III bisa dipengaruhi oleh usia yang terlalu muda dan terlalu tua. Adapun gravida juga mempengaruhi karena terlalu sering melahirkan tempat implantasi plasenta kemungkinan menjadi salah satu faktor lamanya kala III persalinan yang menyebabkan perdarahan *post partum*.

Kesimpulan

Hasil analisis univariat menunjukkan bahwa dari 92 ibu bersalin waktu lama kala III ≤ 15 menit sebanyak 64 orang (69,6%), sedangkan yang mengalami perdarahan *post*

partum sebanyak 21 orang (22.8%). Uji *Chi Square* diperoleh nilai p value = $0,044 < 0,05$. Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan lama kala III dengan kejadian perdarahan pada ibu *post partum* di RSUD 45 Kuningan Kabupaten Kuningan. Disarankan bagi tenaga kesehatan khususnya bidan lebih meningkatkan kualitas dalam prosedur penanganan persalinan terutama dalam penerapan manajemen aktif kala III untuk menurunkan angka kejadian pascapersalinan.

Daftar Pustaka

- Mochtar, R. (2012). *Sinopsis Obstetri*. Jakarta : EGC.
- Nurasiah, A., Rukmawati, A., & Badriah, D. L. (2014). *Asuhan kebidanan Persalinan Normal bagi Bidan*. Bandung : Refika Aditama.
- Nurjanah, S. ., Siti, A. M., & Laelatul, D. B. (2013). *Asuhan Kebidanan Postpartum Dilengkapi dengan Asuhan Kebidanan Post Sectio Caesarea*. Bandung : Refika Aditama.
- Prawiroharjo, S. (2012). *Ilmu Kebidanan*. Jakarta : Bina Pustaka
- Sisca Alviani, E., Wijaya, M., & Kurnia Aprilliani, I. (2018). Gambaran Lama Waktu Pelepasan Plasenta Dengan Manajemen Aktif Kala III Dan Masase Fundus Setelah Bayi Lahir Di Rsud Kelas B Kabupaten Subang. *Jurnal Sistem Kesehatan*, 3(4).

<https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jsk.v3i4.18496>

dicatorgenderharusmasukpelaksanaans
dgs/

Wardah, F. (2016). *Indikator Gender Harus Masuk dalam Pelaksanaan SDGs*.
<http://www.djogjasumberberita.com/in>

WHO. (2018). *Maternal mortality*.